

## mFOLFIRINOX

ID	薬品名 トポテシン	150 mg/m <sup>2</sup>
name	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>
身長	5-FU(持続注入)	2400 mg/m <sup>2</sup>
体重		
体表面積		

がん種      膵臓癌                      投与スケジュール   : 1クール2w

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 50mL			
2、生食 100mL デカドロン4.95mg(プロイメンド不使用時は9.9mg) アロキシ0.75mg プロイメンド150mg	30分		
3、生食 50mL	bolus		
4、オキサリプラチン(                      )mg 5%ブドウ糖 250mL	2時間		
5、レボホリナート(                      )mg 5%ブドウ糖 250mL	2時間		30分
		6、イリノテカン(                      )mg 生食 250mL (レボホリナートから30分遅れて投与開始)	90分
7、生食 50mL	bolus		
8、5-FU(                      )mg 生食 (表参照 ※) インフューザーポンプ使用 生食 50mL bolus終了後	46時間 2mL/hr		

10、ヘパロック

備考:d2、d3   リンデロン錠 8mg(16錠)。 イメンド使用時はなし。4mg(8錠)は可。